

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мاستиет Форте для лечения
маститита у коров в период лактации

(организация-разработчик: компания «Интервет Интернешнл Б.В.», Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V., Wim de Körperstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Маститет Форте (Mastijet[®] Forte).

Международные непатентованные наименования: тетрациклин, неомицин, бацитрацин, преднизолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Маститет Форте в 1 шприце-дозаторе в качестве действующих веществ содержит: 200 мг тетрациклина (в форме гидрохлорида), 250 мг неомицина (в форме сульфата), 2000 МЕ бацитрацина и 10 мг преднизолона, в качестве вспомогательных веществ — стеарат магния и вазелиновое масло.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую суспензию желтоватого цвета.

Срок годности Маститет Форте при соблюдении условий хранения и транспортирования 24 месяца со дня производства.

Маститет Форте запрещается применять по истечении срока годности.

4. Маститет Форте выпускают расфасованным по 8 г в пластиковые шприцы-дозаторы одноразового применения, наконечники которых снабжены защитными колпачками. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в картонные коробки вместе с очищающими салфетками и инструкцией по применению.

5. Маститет Форте хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°С до 8°С.

6. Маститет Форте хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Маститет Форте отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мاستиет Форте относится к комбинированным антибактериальным лекарственным препаратам.

10. Комбинация антибиотиков, входящих в состав Мاستиет Форте, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, наиболее часто выделяемых при мастите коров, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus disagalactiae*, *Streptococci uberis*, *Klebsiella spp*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Escherichia coli*.

Механизм действия входящих в состав препарата тетрациклина и неомицина заключается в ингибировании синтеза белков в бактериальной клетке.

Бацитрацин, проникая в бактериальную клетку, связывается с рецепторами на ее внутренней поверхности и нарушает синтез пептидогликана — основного компонента клеточной стенки.

Преднизолон — глюкокортикостероид, обладая противовоспалительным и противоаллергенным действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени. При введении лекарственного препарата в молочные цистерны действующие вещества проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов.

Маститет Форте по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) и не оказывает раздражающего действия на ткани вымени.

III. Порядок применения

11. Маститет Форте предназначен для лечения клинической и субклинической форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

12. Противопоказанием для применения является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не рекомендуется применять Маститет Форте коровам в период сухостоя, а также использовать очищающие салфетки для обработки сосков вымени с открытыми ранами.

13. Маститет Форте вводят в пораженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) 3-4-кратно с интервалом 12 часов.

Перед применением лекарственного препарата четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют кончик соска прилагаемой очищающей салфеткой. Затем удаляют верхушку защитного колпачка с наконечника шприца-дозатора, вводят наконечник в молочный канал (на 5 мм) или удаляют колпачок полностью и вводят наконечник в сосковый канал на всю его длину. Предпочтительным способом является частичное введение, при невозможности его выполнения наконечник шприца-дозатора вводят на всю его длину, при этом эффективность лечения не снижается. Содержимое шприца-дозатора (1 доза) осторожно выдавливают в четверть вымени; извлекают шприц-дозатор, пережимают верхушку соска и массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

14. Симптомы передозировки при применении Маститет Форте не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлены.

16. Отсутствуют противопоказания к применению в период беременности и лактации. Не рекомендуется применять лекарственный препарат за 2 месяца до отела.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении Мاستиет Форте в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии, применение Мاستиет Форте прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение Мاستиет Форте не исключает использование других лекарственных средств для животных, за исключением препаратов для интрацестернального введения.

20. В пищевых целях молоко может быть использовано не ранее, чем через 96 часов после последнего введения Маститет Форте. Молоко из здоровых четвертей вымени, полученное ранее установленного срока, можно использовать после кипячения в корм животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения Маститет Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Маститет Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Маститет Форте. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу; после работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается использование пустых шприцев-дозаторов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, The Netherlands/ «Интервет
Интернешнл Б.В.», Вим Де
Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 AA
Боксmeer, Нидерланды.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Интервет» (Россия, 143345,
Московская область, Наро-
Фоминский район, пос. Селятино,
ул. Промышленная, дом 81/1).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по
применению Мاستиет Форте, утвержденная Россельхознадзором 13.12.2011 г.

Номер регистрационного удостоверения *528-3-36.12-1198 N7BCU-3-0.2/01097*