



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

15 июля 2011

ИНСТРУКЦИЯ по применению Мультибай ИММ для лечения мастита у коров в период лактации

(организация - разработчик фирма «Norbrook Laboratories Limited,
Великобритания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мультибай ИММ (Multibay ИММ).

Международное непатентованное наименование: пенициллина прокаин, стрептомицина сульфат, неомицина сульфат и преднизолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

В одном шприце-дозаторе Мультибай ИММ в качестве действующих веществ содержится: пенициллина прокаин - 100 мг, стрептомицина сульфат - 100 мг, неомицина сульфат - 100 мг и преднизолон - 10 мг, а в качестве вспомогательных веществ: жидкий парафин - 3,52 г и белый мягкий парафин - 1,17 г. По внешнему виду препарат представляет собой однородную суспензию светло-желтого цвета.

3. Выпускают Мультибай ИММ в виде стерильной суспензии, расфасованной по 5 г, в одноразовых пластиковых шприцах-дозаторах, упакованных по 24 или 120 штук в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят Мультибай ИММ в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

По истечении срока годности Мультибай ИММ не должен применяться.

5. Мультибай ИММ следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Мультибай ИММ относится к комбинированным противомаститным антибактериальным препаратам. Комбинация антибиотиков: пенициллина прокаина, стрептомицина сульфата и неомицина сульфата, входящих в состав лекарственного препарата, обеспечивает широкий спектр его противомикробного действия в отношении наиболее часто выделяемых при мастите микроорганизмов, в т.ч. стафилококков (*S. aureus*), стрептококков (*S. agalactiae*, *S. uberis*, *S. dysgalactiae*), коринебактерий (*Corynebacterium pyogenes*), эшерихий (*E. coli*),

включая штаммы, устойчивые к пенициллину, тетрациклину, левомецетину и другим антибиотикам.

Преднизолон - синтетический гlikококортикостероид, оказывая противовоспалительное действие, снижает воспаление и уменьшает отек тканей вымени.

Мультибай IMM по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает местно-раздражающего действия на ткани молочной железы.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Мультибай IMM применяют для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

9. Противопоказанием к применению Мультибая IMM является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Перед применением Мультибая IMM молоко (секрет) из больных четвертей вымени выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфицирующим раствором, затем в канал соска вводят канюлю шприца-дозатора и осторожно выдавливают содержимое. После этого канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного средства.

11. Введение лекарственного средства в пораженные четверти вымени проводят в дозе 5 г (содержимое 1 шприца в каждую пораженную четверть) трехкратно с интервалом 24 часа.

12. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

13. Особенности действия при начале приема и при отмене препарата не выявлено.

14. Мультибай IMM, как правило, не вызывает побочных явлений и осложнений у коров. При повышенной индивидуальной чувствительности животных к входящим в состав препарата антибиотикам и появлении признаков аллергии, применение Мультибая IMM прекращают и животным назначают антигистаминные средства.

15. Применение Мультибая IMM не исключает использование других лекарственных средств для животных, кроме средств для интрацистернального введения.

16. Использование молока в пищевых целях разрешается не ранее, чем через 96 часов после последнего введения Мультибая IMM коровам.

Молоко, полученное от коров в период лечения и в течение 96 часов после последнего введения лекарственного средства, из здоровых четвертей вымени после кипячения может быть использовано в корм животным, молоко из обработанных четвертей вымени обеззараживают и утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения Мультибая IMM. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Мультибаем IMM следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мультибаем IMM. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование шприцов-дозаторов из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Пустые шприцы-дозаторы утилизируются с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: фирма «Norbrook Laboratories Limited»; 105 Armagh Road, Newry BT35 6PU, Country Down, Northern Ireland.

Инструкция разработана ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1) совместно с фирмой «Norbrook Laboratories Limited» (Великобритания).

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию, утвержденную Россельхознадзором 22.05.2008 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационное свидетельство выдано фирме ЗАО «Байер», Москва.

Регистрационный номер ПВИ-2-4.8/02410