

**Листок-вкладыш – информация для пациента****ИНОЛ, 100 мл, раствор для наружного применения****ИНОЛ, 500 мл, раствор для наружного применения****ИНОЛ, 1000 мл, раствор для наружного применения**

Действующее вещество:

100 мл: Спирт этиловый (в виде спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья 96,4 % по объему)- 63,59 г;

500 мл: Спирт этиловый (в виде спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья 96,4 % по объему) - 317,95 г;


1000 мл: Спирт этиловый (в виде спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья 96,4 % по объему) - 635,89 г.

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша.**

1. Что собой представляет препарат ИНОЛ, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата ИНОЛ.
3. Применение препарата ИНОЛ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ИНОЛ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



### **1. ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ИНОЛ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат ИНОЛ, содержит в качестве действующего вещества спирт этиловый, представляет собой розовый прозрачный или слегка опалесцирующий раствор, с характерным спиртовым запахом. При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно-раздражающее действие. Препарат ИНОЛ активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных грибов рода Кандида и вирусов. Препарат применяется для:

- гигиенической и хирургической антисептики кожи рук персонала в организациях здравоохранения;
- антисептической обработки кожных покровов пациентов перед проведением инвазивных манипуляций (инъекции, трансфузии, забор крови т.д.).

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### **2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ИНОЛ**

**Не применяйте препарат ИНОЛ, если:**

у вас аллергия на спирт этиловый или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

**Особые указания и меры предосторожности.**

Перед началом применения препарата ИНОЛ проконсультируйтесь с лечащим врачом или медицинской сестрой.

Препарат показан только для наружного применения.

Следует избегать попадания препарата ИНОЛ в глаза. При случайном попадании препарата в глаза следует немедленно тщательно промыть их большим количеством проточной питьевой воды в течение 5-10 мин. В случае появления резкой боли, слезотечения, выраженного отека, покраснения век и конъюнктивы – обратиться к врачу.

Особенностей применения у пациентов с нарушением функции печени и почек нет.

Особенностей применения у пациентов пожилого возраста нет.

#### Дети.

При использовании у детей старше 1 года следует руководствоваться теми же рекомендациями, что и для взрослых. Обработку кожных покровов у детей грудного возраста, в случаях, когда площадь нанесения препарата составляет значительную часть от общей площади кожного покрова пациента, рекомендуется проводить под наблюдением педиатра и/или клинического фармаколога.

#### Беременность и грудное вскармливание.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или медицинской сестрой.

При беременности и в период лактации препарат применяют тогда, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

#### Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат ИНОЛ содержит спирт этиловый. В связи с возможным поступлением через кожу этанола и его угнетающим действием на ЦНС, соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с опасными механизмами.

### 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИНОЛ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Для точного дозирования препарата при проведении гигиенической/хирургической антисептики рук и в целях предупреждения контаминации препарата рекомендуется использовать настенные локтевые дозаторы.

#### Способ применения и дозы.

##### *Гигиеническая антисептика рук.*

На сухие, чистые руки нанести 3 мл препарата ИНОЛ, массирующими движениями втирать в течение 30 секунд в кожу по методике, рекомендованной EN 1500. По окончании экспозиции руки досушивают на воздухе до полного высыхания препарата.

В случаях сильного загрязнения рук, перед проведением гигиенической обработки необходимо тщательно вымыть руки водой комнатной температуры с жидким мылом и высушить. Препарат наносить только на чистую, сухую кожу.

##### *Хирургическая антисептика рук.*

Перед проведением хирургической антисептики рук необходимо тщательно вымыть руки и предплечья теплой водой с жидким мылом в течение 1-2 минут и тщательно высушить.

На сухие, чистые руки дважды нанести по 5 мл препарата ИНОЛ, массирующими движениями втирать в течение 5 минут в кожу по методике, рекомендованной EN 1500. По окончании экспозиции руки досушивают на воздухе до полного высыхания препарата. Хирургические перчатки надевают на сухие руки. Реманентное (остаточное) действие сохраняется в течение 3-х часов. При длительности операции > 3 часов антисептическую обработку рук хирургов и членов операционной бригады необходимо повторить. В процессе операции допускается использовать препарат для периодического удаления видимых загрязнений с перчаток, надетых на руки медицинского персонала (например, крови и других биологических субстратов).


*Антисептическая обработка кожных покровов пациентов перед проведением манипуляций, связанных с нарушением целостности кожных покровов (инъекции, трансфузии, катетеризация кровеносных сосудов, антисептическая обработка локтевых сгибов доноров, перед взятием анализов крови и пр.).*

На сухую чистую кожу при помощи стерильного ватно-марлевого тампона нанести препарат ИНОЛ, время экспозиции 30 секунд - 1 минута.

#### Различные возрастные группы.

##### *Применение у детей*

При использовании у детей старше 1 года следует руководствоваться теми же рекоменда-



ями, что и для взрослых. Обработку кожных покровов у детей грудного возраста, в случаях, когда площадь нанесения препарата составляет значительную часть от общей площади кожного покрова пациента, рекомендуется проводить под наблюдением педиатра и/или клинического фармаколога.

#### *Применение у пожилых людей*

Особенностей применения у пациентов пожилого возраста нет.

#### **Особенности применения у пациентов с нарушением функции печени и почек.**

Особенностей применения у пациентов с нарушением функции печени и почек нет.

#### **Если вы применили препарата ИНОЛ больше, чем следовало.**

Явления передозировки при наружном применении препарата маловероятны. В случае случайного приема препарата внутрь рекомендуется срочно обратиться за медицинской помощью.

### **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

#### **4.1. Описание нежелательных реакций.**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызывать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Частота нижеперечисленных возможных нежелательных реакций является *неизвестной* (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции.
- сухость, шелушение, покраснение и другие признаки местного раздражения кожных покровов.

За пациентами следует тщательно наблюдать и, если наблюдаются какие-либо из перечисленных выше явлений, применение препарата ИНОЛ должно быть ограничено или прекращено и/или должны быть предприняты надлежащие меры. В частности, для устранения этих явлений рекомендуется обработать проблемные участки кожи увлажняющим или питательным кремом.

Если какая-либо из нежелательных реакций становится серьезной, или если Вы заметили какие-либо нежелательные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему лечащему врачу.

#### *Дополнительные нежелательные реакции у детей:*

Ожидается, что частота, вид и тяжесть нежелательных реакций у детей старше 1 года и взрослых одинаковы. Обработку кожных покровов у детей грудного возраста, в случаях, когда площадь нанесения препарата составляет значительную часть от общей площади кожного покрова пациента, рекомендуется проводить под наблюдением педиатра и/или клинического фармаколога.

#### **4.2. Сообщение о нежелательных реакциях.**

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

г. Минск, 220037, Товарищенский пер., 2а


Телефон: + 375 (17) 242-00-29

### **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИНОЛ**

- Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
- Срок годности – 3 года.

#### **5.1. Дата истечения срока годности (срока хранения).**

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на



этикетке (датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного в специальном окошке, промаркированном надписью «Годен до»)

## 5.2. Условия хранения.

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от продуктов питания, в оригинальной упаковке производителя, при температуре не выше 25 °С. Беречь от огня. Легковоспламеняющаяся жидкость.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

### 6.1. Препарат ИНОЛ содержит:

**на 100 мл:** действующее вещество: спирт этиловый (в виде спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья 96,4 % по объему)- 63,59 г, вспомогательные вещества: спирт изопропиловый 3,23 г, полиэтиленгликоль-400 г, эфиры целлюлозы, отдушка косметическая, краситель Кармуазин E122, вода очищенная до 100 мл;

**на 500 мл:** действующее вещество: спирт этиловый (в виде спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья 96,4 % по объему) - 317,95 г; вспомогательные вещества: спирт изопропиловый 16,15 г, полиэтиленгликоль-400, эфиры целлюлозы, отдушка косметическая, краситель Кармуазин E122, вода очищенная до 500 мл;

**на 1000 мл:** действующее вещество: спирт этиловый (в виде спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья 96,4 % по объему) - 635,89 г; вспомогательные вещества: спирт изопропиловый 32,3 г, полиэтиленгликоль-400, эфиры целлюлозы, отдушка косметическая, краситель Кармуазин E122, вода очищенная до 1000 мл.

### 6.2. Внешний вид препарата ИНОЛ и содержимое упаковки.

*Лекарственная форма:*

Раствор для наружного применения.

*Внешний вид:*

Розовый прозрачный или слегка опалесцирующий раствор, с характерным запахом.

*Упаковка:*

Флаконы полимерные синего цвета вместимостью 1000 мл в картонных коробках по 10 флаконов вместе с 10-ю листками-вкладышами в каждой коробке.

Флаконы полимерные синего цвета вместимостью 500 мл в картонных коробках по 20 флаконов вместе с 20-ю листками-вкладышами в каждой коробке.

Флаконы полимерные белого цвета вместимостью 100 мл в картонных коробках по 30 флаконов вместе с 30-ю листками-вкладышами в каждой коробке.

*Условия отпуска.*

Флаконы по 1000 мл, 500 мл и 100 мл в картонных коробках по 10, 20, 30 флаконов соответственно - для стационаров.

### 6.3. Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

Республика Беларусь, Общество с ограниченной ответственностью «ИНКРАСЛАВ» (ООО «ИНКРАСЛАВ»), 223053 Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 19, тел./факс (017) 518-10-85 (приемная), 515-11-88 (отдел сбыта), e-mail: [info@inkraslav.org](mailto:info@inkraslav.org)

*Все претензии потребителей следует направлять держателю регистрационного удостоверения:* Республика Беларусь, 223053 Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 19, тел./факс (017) 518-10-85 (приемная), 515-11-88 (отдел сбыта), e-mail: [info@inkraslav.org](mailto:info@inkraslav.org)

### 6.4. Данный листок-вкладыш пересмотрен